

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

<https://www.e-oncologia.org/cursos/prevencion-del-cancer-de-cuello-uterino/>

Código promocional: Cursoprevencion2019

¡CUIDADO CAMBIA EL ORDEN! ADEMÁS HAY DOS INTENTOS REALIZADOS, HAY PREGUNTAS REPETIDAS EN AMBOS INTENTOS. ALGUNAS RESPUESTAS INCORRECTAS DEL PRIMER INTENTO, ESTÁN RESPONDIDAS CORRECTAMENTE EN EL SEGUNDO

CON AMBOS INTENTOS ESTÁ APROBADO

INTENTO 1

Pregunta 1: Correcta

Aunque los tipos del VPH 16, 18 y 45 son los más frecuentes en los casos de cáncer de cuello uterino, su distribución varía de manera significativa entre el carcinoma de células escamosas (CEC) y el adenocarcinoma (ADC).

Seleccione una:

- a. Los tipos del VPH 18 y 45 se detectan con igual frecuencia en los CEC's que en los adenocarcinomas.
- b. Los tipos del VPH 18 y 45 se encuentran con mayor frecuencia en los adenocarcinomas que en los carcinomas de células escamosas.
- c. Los tipos del VPH 18 y 45 se detectan con mayor frecuencia en los CEC's que en los adenocarcinomas.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Es necesaria la aplicación de una "dosis de recuerdo" después de las 3 dosis de la vacuna?

Seleccione una:

- a. Por ahora no se ha establecido la necesidad de una dosis de recuerdo.
- b. Sí, pero sólo en mujeres mayores de 26 años.
- c. No. Está suficientemente demostrado que con las tres dosis que forman la vacuna está protegida de por vida.

Pregunta 3

Incorrecta → respuesta correcta: A
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los niveles de anticuerpos más altos y duraderos, los debidos a la vacuna o los producidos por una infección adquirida?

Seleccione una:

- a. Los resultados publicados hasta ahora ponen de manifiesto que los individuos inmunizados con la vacuna han reportado respuestas de anticuerpos anti-L1 de VLPs sustancialmente superiores a las observadas en las infecciones naturales.
- b. Los resultados publicados hasta ahora, demuestran que el nivel de anticuerpos anti-L1 de VLPs en individuos vacunados no tiene ninguna diferencia significativa con los niveles de anticuerpos producidos por una infección adquirida.
- c. Aún no hay estudios que nos demuestren si el nivel de anticuerpos es mayor con la vacuna o con la infección natural por VPH.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- a. En la actualidad, las pruebas de HC2 y la de PCR con GP5+ /6+ e inmunoensayo enzimático han sido clínicamente validadas como método de cribado.
- b. No existen técnicas clínicamente validadas para ser utilizadas como método de cribado.
- c. En la actualidad, hay varias técnicas de PCR comerciales que han sido clínicamente validadas para ser utilizadas como método de cribado.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cómo definiría el papel del VPH en la etiología del cáncer de cuello uterino?

Seleccione una:

- a. El VPH constituye una causa suficiente para el desarrollo del cáncer de cuello uterino, pero no necesaria.
- b. El VPH constituye una causa necesaria para el desarrollo del cáncer de cuello uterino, pero no suficiente.
- c. El VPH no es una causa para el desarrollo del cáncer de cuello uterino, sino una consecuencia.

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Pueden las vacunas actuales contra el VPH prevenir todos los cánceres relacionados con el VPH?

Seleccione una:

- a. Ambas vacunas sólo están diseñados para prevenir los cánceres de cuello uterino asociados a los tipos 16 y 18 del VPH.
- b. Ambas vacunas están diseñadas para prevenir la infección causada por los tipos oncogénicos 16 y 18 del VPH, y en última instancia las lesiones anogenitales premalignas asociadas a los tipos 16 y 18 del VPH.
- c. Ambas vacunas están diseñadas para prevenir todos los cánceres asociados a los tipos 16 y 18 del VPH.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Qué es el cribado del cáncer de cuello uterino?

Seleccione una:

- a. El cribado de cáncer de cuello uterino es una intervención de salud pública que se realiza en una población asintomática cuyo objetivo es prevenir la incidencia y mortalidad por cáncer invasivo mediante la detección precoz de las lesiones precancerosas.
- b. El cribado del cáncer de cuello uterino es una intervención de salud pública realizada en forma independiente de un programa organizado o en base poblacional.
- c. El cribado del cáncer de cuello uterino es una intervención de salud pública diseñada por una estructura central de salud pública para alcanzar la mayor cobertura posible de las mujeres.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- a. Los tipos del VPH 6 y 11 son responsables de la mayoría de casos de neoplasia cervical.
- b. Los tipos del VPH 6 y 11 son responsables de la mayoría de las verrugas genitales y de la papilomatosis respiratoria recurrente.
- c. Los tipos del VPH 6 y 11 son responsables de la mayoría de casos de neoplasia de piel.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones NO es la correcta?

Seleccione una:

- a. El cáncer de cuello uterino es el resultado final de una cadena de eventos que pueden tardar más de 10 años en desarrollarse.
- b. La mayoría de las infecciones en las mujeres jóvenes no desaparecen.
- c. Las infecciones por VPH, que persisten durante 2 o más años están altamente vinculadas a las lesiones precancerosas.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿A qué edad es más alta la prevalencia del VPH en una población determinada?

Seleccione una:

- a. La prevalencia del VPH es más elevada en la menopausia.
- b. La prevalencia del VPH no depende de la edad.
- c. La prevalencia del VPH es más elevada en los adultos jóvenes.

Pregunta 11

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta?

Seleccione una:

- a. El cáncer anal es una neoplasia poco frecuente en las mujeres, pero la incidencia es particularmente elevada en los hombres.
- b. El cáncer anal es el tumor con mayor incidencia entre los tumores anogenitales asociados al VPH.
- c. El cáncer anal es una neoplasia poco frecuente, pero la incidencia es especialmente elevada entre los hombres que tienen sexo con hombres.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- a. Aproximadamente el 100% de los cánceres de pene y el 40% de los cánceres anales son atribuibles al VPH.
- b. Aproximadamente el 60% de los cánceres de cavidad oral y de orofaringe son atribuibles al VPH.
- c. Aproximadamente el 40% de los cánceres de vulva y el 70% de cánceres de vagina son atribuibles al VPH.

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Es necesario que una mujer vacunada continúe realizándose citologías rutinarias de cribado?

Seleccione una:

- a. No, si ya está vacunada, no hay que hacerle citologías de cribado.
- b. Sí, porque la vacuna no protege contra todos los tipos del VPH y no se conoce la duración de la protección asociada a la vacuna. Probablemente el cribado deba adaptarse para las cohortes de mujeres vacunadas.
- c. Sí, pero sólo durante los 5 años siguientes tras la vacunación.

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la papilomatosis respiratoria recurrente (PRR) es la correcta?

Seleccione una:

- a. La papilomatosis respiratoria recurrente es una infección de las vías respiratorias por el VPH, que se producen principalmente en los niños menores de 10 años de edad, y principalmente asociada a la transmisión de madres a recién nacidos a través de la exposición a las verrugas genitales en el canal de parto.
- b. La papilomatosis respiratoria recurrente está causada principalmente por los tipos 6 y 11 del VPH, con una pequeña fracción causada por el HPV 16 u otros tipos.
- c. Ambas respuestas son correctas.

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Se podría vacunar a una paciente con VIH?

Seleccione una:

- a. No se recomienda la administración de la vacuna en pacientes VIH positivos, pues se ha establecido que no se segura.
- b. Sí se podría vacunar. El hecho de estar infectada por el VIH no representa, en ningún caso, una contraindicación para la vacuna frente al VPH.
- c. No, no se podría vacunar en ningún caso, porque en personas inmunodeprimidas, el riesgo de quedar infectadas por los tipos del VPH que contiene la vacuna es muy alto.

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Se puede vacunar contra el VPH a una mujer embarazada?

Seleccione una:

- a. No se recomienda la administración de la vacuna en mujeres embarazadas.
- b. Los datos que existen son insuficientes para recomendar el uso de la vacuna durante el embarazo. En caso de embarazo, la vacunación debe posponerse.
- c. Ambas respuestas son correctas.

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Una mujer acude a la consulta. Hace 2 años fue tratada por una lesión de alto grado. Actualmente se le ha hecho una citología con diagnóstico de ASC-US y nos pregunta si se puede vacunar. ¿Sería efectiva la vacuna para esta mujer?

Seleccione una:

- a. La vacuna no tiene ningún efecto terapéutico, pero le puede conferir inmunidad para aquellos tipos para los que aún no esté infectada y estén contenidos en la vacuna.
- b. Quedaría inmunizada igualmente, la eficacia de la vacuna es independiente de una infección previa.
- c. No tendría sentido, la vacuna no sería perjudicial pero tampoco le causaría ningún efecto beneficioso ya que la paciente está afectada por una infección por VPH previamente establecida.

Pregunta 18

Incorrecta → respuesta correcta: B
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuántas dosis de la vacuna contra el VPH se recomiendan?

Seleccione una:

- a. Las pautas alternativas de vacunación que reducen el número de dosis se han estudiado ampliamente, pero se recomienda la pauta de 3 dosis, porque proporciona una mayor seguridad e inmunogenicidad.
- b. Para ambas vacunas se recomienda actualmente una pauta de vacunación de 3 dosis, aunque existen varios estudios en curso analizando pautas alternativas.
- c. Aunque para ambas vacunas se recomienda una pauta de vacunación de tres dosis, una pauta con 2 dosis confiere suficiente protección.

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta?

Seleccione una:

- a. Los tumores de cabeza y cuello no están asociados al VPH.
- b. La prevalencia del VPH en los tumores de cabeza y cuello no puede interpretarse como un indicador de causalidad a excepción del caso de los tumores de orofaringe.
- c. Si observa una elevada prevalencia del VPH en los tumores de cabeza y cuello, y es probable que el VPH tenga en este tipo de tumores un rol similar al que tiene en el cáncer de cuello uterino.

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la situación actual de las vacunas contra el VPH en relación a las personas infectadas por el VIH?

Seleccione una:

- a. Las vacunas contra el VPH no están indicadas en las personas infectadas por el VIH.
- b. Ambas vacunas son seguras e inmunogénicas en las personas infectadas por el VIH.
- c. Actualmente se están evaluando la seguridad y la inmunogenicidad de las dos vacunas contra el VPH en las personas infectados por el VIH, pero parecen ser seguras y bien toleradas.

Pregunta 21

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes estrategias puede reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer de cuello uterino a nivel mundial?

Seleccione una:

- a. La vacunación frente al VPH y el cribado del cáncer de cuello uterino.
- b. El uso del preservativo masculino y de la circuncisión masculina.
- c. Tratamiento y los cuidados paliativos.

Pregunta 22

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los factores que pueden reducir el riesgo de infección por el VPH?
(Existe más de una respuesta correcta)

Seleccione una o más de una:

- a. Bajo consumo de carne.
- b. Circuncisión masculina.



c. Uso de preservativo masculino.

Pregunta 23

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Las vacunas contra el VPH, actualmente disponibles, son vacunas profilácticas o terapéuticas?

Seleccione una:



a. Profilácticas.



b. Profilácticas y terapéuticas.



c. Terapéuticas.

Pregunta 24

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Un tema clave en la introducción de la vacuna del VPH es si vacunar a ambos sexos aumenta significativamente el impacto comparado con vacunar sólo a mujeres. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta?

Seleccione una:



a. Vacunar a un solo sexo equivale a lograr la mitad de la cobertura que se conseguiría si se vacunara a ambos sexos.



b. Vacunar a un número determinado de mujeres consigue mayor reducción que vacunar el mismo número total de ambos sexos.



c. Los beneficios de vacunar solo a niñas son limitados.

Pregunta 25

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el estado actual de la vacunación contra el VPH en los países en vías de desarrollo?

Seleccione una:



a. Desde el año 2013, la gran mayoría de los países en vías de desarrollo han llevado a cabo proyectos de demostración a un coste de 4,50 US\$ por dosis, con el fin de adquirir la experiencia necesaria para la puesta en marcha de programas nacionales de vacunación contra el VPH.



b. Debido al alto coste de la vacuna y a la complejidad para vacunar a las niñas de 9 a 13 años, las vacunas contra el VPH están disponibles en programas de vacunación sistemática únicamente en los países de altos ingresos.



c. Desde que GAVI comenzó a apoyar la vacunación contra el VPH en el año 2013, algunos países han sido aceptados para obtener las vacunas a un coste de 4,50 US\$ por dosis. En la mayoría de los casos se trata de proyectos de demostración con el fin de

desarrollar la capacidad e infraestructuras necesarias para establecer un programa de vacunación en todo el país.

Pregunta 26

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Los estudios realizados en países con programas de cribado ya establecidos se han centrado en identificar: el intervalo óptimo entre visitas para cribado, la edad de inicio y de fin del cribado y la consideración de alternativas que contribuyan a mejorar la citología. ¿Cuáles son las principales conclusiones de estos estudios?

Seleccione una:

- a. Las mujeres entre 18 y 65 años constituyen el grupo de edad diana más apropiado para un programa de cribado. Para las mujeres con resultados previos negativos, el intervalo óptimo entre cribados es de 3 a 5 años. Los países deberían considerar la introducción de la detección del VPH como prueba secundaria de cribado para las mujeres con una citología positiva.
- b. Las mujeres entre 18 y 65 años constituyen el grupo de edad diana más apropiado para un programa de cribado. Para las mujeres con resultados previos negativos, el intervalo óptimo entre cribados es de 3 a 5 años. Los países deberían considerar la introducción de la detección del VPH como prueba primaria de cribado y reservar la citología para las mujeres VPH positivas.
- c. Las mujeres entre 25 y 65 años constituyen el grupo de edad diana más apropiado para un programa de cribado. Para las mujeres con resultados previos negativos, el intervalo óptimo entre cribados es de 3 a 5 años. Los países deberían considerar la introducción de la detección del VPH como prueba primaria de cribado para las mujeres mayores de 30 o 35 años y reservar la citología para las mujeres más jóvenes VPH positivas.

Pregunta 27

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos problemas está asociado a la infección por VIH?

Seleccione una:

- a. Un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de la orofaringe.
- b. Una menor probabilidad de detectar las infecciones por el VPH.
- c. Una mayor prevalencia del VPH.

Pregunta 28

Incorrecta → respuesta correcta: A
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Qué comportamientos aumentan el riesgo de exposición al VPH?

Seleccione una:

- a. Tener nuevas parejas sexuales e iniciación sexual a una edad temprana.

b. La paridad y el uso a largo plazo de anticonceptivos hormonales.

c. Todas las anteriores.

Pregunta 29

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Muchas mujeres adquieren una infección por VPH, pero la gran mayoría de estas infecciones no progresan a cáncer de cérvix. Así pues, probablemente otros co-factores intervienen en el proceso patológico. ¿Cuáles de estos co-factores han sido establecidos en la carcinogénesis cervical?

Seleccione una:

a. Antecedentes familiares y ser fumadora.

b. Alta paridad, uso a largo plazo de anticonceptivos orales, ser fumadora y co-infección por otros agentes de transmisión sexual.

c. Dieta rica en grasas saturadas y el uso de algunos fármacos.

Pregunta 30

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Debería hacerse la prueba de detección del VPH a toda mujer que desea vacunarse?

Seleccione una:

a. Sí, porque la vacuna sólo es eficaz en las mujeres que sean negativas para los tipos del VPH incluidos en la vacuna.

b. No es necesario realizar la prueba de detección del VPH previa a la vacunación.

c. Sí, ya que si es positiva para la prueba, se le recomendaría no vacunarse.

SEGUNDO INTENTO

Calificación 9,33 de 10,00 (93%)

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las oncoproteínas que promueven la proliferación y la supervivencia de las células infectadas por el VPH?

Seleccione una:

- a. E1, E2, E4 y E6.
- b. L1 y L2.
- c. E6 y E7.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Está la mujer protegida con una sola dosis de vacuna?

Seleccione una:

- a. Sí, pero sólo en aquellas mujeres menores de 20 años, ya que su sistema inmunitario es mucho más eficaz que el de las mujeres mayores a esa edad.
- b. No, con una sola dosis el sistema inmunológico no tiene el tiempo suficiente para generar anticuerpos contra los tipos que incluye la vacuna.
- c. Por el momento no existen pruebas suficientes de que con una sola dosis la mujer quede totalmente protegida.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿A qué edad deben vacunarse las mujeres para que la vacuna tenga la máxima eficacia?

Seleccione una:

- a. Cualquier mujer puede ser vacunada, la eficacia es independiente de la edad.
- b. Sólo pueden ser vacunadas las niñas y mujeres de 15 años que no están infectadas con el VPH.
- c. Prioritariamente entre los 9 y los 14 años, porque a esta edad la mayoría de las niñas no habrán tenido todavía relaciones sexuales.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Qué regiones del mundo tienen las prevalencias más elevadas de cáncer de cuello uterino?

Seleccione una:

- a. América Latina y Caribe, África Sub-Sahariana y Asia Central y del Sur.
- b. Europa, Norteamérica y Japón.
- c. China y Asia Occidental.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Qué pasa si se vacuna a una mujer que ya está infectada por el VPH?

Seleccione una:

- a. La vacuna es perjudicial en mujeres ya infectadas por el VPH y no se recomienda su uso en este grupo de mujeres.
- b. La vacuna le proporcionará un cierto beneficio. Aunque la vacuna no tiene un efecto terapéutico demostrado, le proporcionará inmunidad contra los tipos vacunales para los que no está infectada.
- c. La vacuna no sería perjudicial pero tampoco le proporcionará ningún tipo de efecto beneficioso ya que la paciente ya sufre una infección por VPH.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Qué diferencias existen entre un programa de cribado organizado y el cribado oportunista?

Seleccione una:

- a. El cribado organizado hace peor uso de los recursos disponibles.
- b. El objetivo de los programas organizados de llegar a la máxima cobertura de la población objetivo y seguimiento de las mujeres que acuden y de las que no acuden.
- c. El cribado organizado garantiza que el menor número de mujeres se beneficiarán del mismo.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones no es la correcta?

Seleccione una:

- a. CIN 3 es un precursor cierto del cáncer.
- b. Las lesiones precancerosas son a menudo sintomáticas.
- c. CIN 1 es una lesión que indica que existe una infección por el VPH.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- a. La proporción del tipo 16 del VPH es similar en las mujeres con lesiones precancerosas que en las mujeres con cáncer de cuello uterino.
- b. A medida que disminuye la severidad de las lesiones, también aumenta el papel del VPH del tipo 16.
- c. A medida que se incrementa la severidad de las lesiones, también aumenta el papel del VPH del tipo 16.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta?

Seleccione una:

- a. No se ha demostrado la seguridad y eficacia de la vacuna contra el VPH en niños menores de 9 años de edad.
- b. La vacuna contra el VPH es segura y eficaz en niños menores de 9 años.
- c. La vacuna contra el VPH es segura y eficaz en todas las edades.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Se podría vacunar a una paciente con VIH?

Seleccione una:

- a. No, no se podría vacunar en ningún caso, porque en personas inmunodeprimidas, el riesgo de quedar infectadas por los tipos del VPH que contiene la vacuna es muy alto.
- b. No se recomienda la administración de la vacuna en pacientes VIH positivos, pues se ha establecido que no se segura.
- c. Sí se podría vacunar. El hecho de estar infectada por el VIH no representa, en ningún caso, una contraindicación para la vacuna frente al VPH.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los niveles de anticuerpos más altos y duraderos, los debidos a la vacuna o los producidos por una infección adquirida?

Seleccione una:

- a. Los resultados publicados hasta ahora, demuestran que el nivel de anticuerpos anti-L1 de VLPs en individuos vacunados no tiene ninguna diferencia significativa con los niveles de anticuerpos producidos por una infección adquirida.

b. Los resultados publicados hasta ahora ponen de manifiesto que los individuos inmunizados con la vacuna han reportado respuestas de anticuerpos anti-L1 de VLPs sustancialmente superiores a las observadas en las infecciones naturales.

c. Aún no hay estudios que nos demuestren si el nivel de anticuerpos es mayor con la vacuna o con la infección natural por VPH.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Es necesaria la aplicación de una "dosis de recuerdo" después de las 3 dosis de la vacuna?

Seleccione una:

a. Sí, pero sólo en mujeres mayores de 26 años.

b. Por ahora no se ha establecido la necesidad de una dosis de recuerdo.

c. No. Está suficientemente demostrado que con las tres dosis que forman la vacuna está protegida de por vida.

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Un tema clave en la introducción de la vacuna del VPH es si vacunar a ambos sexos aumenta significativamente el impacto comparado con vacunar sólo a mujeres. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta?

Seleccione una:

a. Vacunar a un número determinado de mujeres consigue mayor reducción que vacunar el mismo número total de ambos sexos.

b. Los beneficios de vacunar solo a niñas son limitados.

c. Vacunar a un solo sexo equivale a lograr la mitad de la cobertura que se conseguiría si se vacunara a ambos sexos.

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Se puede vacunar contra el VPH a una mujer embarazada?

Seleccione una:

a. No se recomienda la administración de la vacuna en mujeres embarazadas.

b. Los datos que existen son insuficientes para recomendar el uso de la vacuna durante el embarazo. En caso de embarazo, la vacunación debe posponerse.

c. Ambas respuestas son correctas.

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los factores que pueden reducir el riesgo de infección por el VPH?

(Existe más de una respuesta correcta)

Seleccione una o más de una:

- a. Circuncisión masculina.
- b. Uso de preservativo masculino.
- c. Bajo consumo de carne.

Pregunta 16

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- a. No existen técnicas clínicamente validadas para ser utilizadas como método de cribado.
- b. En la actualidad, hay varias técnicas de PCR comerciales que han sido clínicamente validadas para ser utilizadas como método de cribado.
- c. En la actualidad, las pruebas de HC2 y la de PCR con GP5+ /6+ e inmunoensayo enzimático han sido clínicamente validadas como método de cribado.

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿A qué edad es más alta la prevalencia del VPH en una población determinada?

Seleccione una:

- a. La prevalencia del VPH es más elevada en la menopausia.
- b. La prevalencia del VPH no depende de la edad.
- c. La prevalencia del VPH es más elevada en los adultos jóvenes.

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes estrategias puede reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer de cuello uterino a nivel mundial?

Seleccione una:

- a. La vacunación frente al VPH y el cribado del cáncer de cuello uterino.
- b. Tratamiento y los cuidados paliativos.
- c. El uso del preservativo masculino y de la circuncisión masculina.

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la situación actual de las vacunas contra el VPH en relación a las personas infectadas por el VIH?

Seleccione una:

- a. Ambas vacunas son seguras e inmunogénicas en las personas infectadas por el VIH.
- b. Actualmente se están evaluando la seguridad y la inmunogenicidad de las dos vacunas contra el VPH en las personas infectados por el VIH, pero parecen ser seguras y bien toleradas.
- c. Las vacunas contra el VPH no están indicadas en las personas infectadas por el VIH.

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Las vacunas contra el VPH, actualmente disponibles, son vacunas profilácticas o terapéuticas?

Seleccione una:

- a. Profilácticas.
- b. Profilácticas y terapéuticas.
- c. Terapéuticas.

Pregunta 21

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- a. Aproximadamente el 100% de los cánceres de pene y el 40% de los cánceres anales son atribuibles al VPH.
- b. Aproximadamente el 40% de los cánceres de vulva y el 70% de canceres de vagina son atribuibles al VPH.
- c. Aproximadamente el 60% de los cánceres de cavidad oral y de orofaringe son atribuibles al VPH.

Pregunta 22

Incorrecta → respuesta correcta: A

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuántas dosis de la vacuna contra el VPH se recomiendan?

Seleccione una:

- a. Para ambas vacunas se recomienda actualmente una pauta de vacunación de 3 dosis, aunque existen varios estudios en curso analizando pautas alternativas.
- b. Aunque para ambas vacunas se recomienda una pauta de vacunación de tres dosis, una pauta con 2 dosis confiere suficiente protección.
- c. Las pautas alternativas de vacunación que reducen el número de dosis se han estudiado ampliamente, pero se recomienda la pauta de 3 dosis, porque proporciona una mayor seguridad e inmunogenicidad.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- a. Los tipos del VPH 6 y 11 son responsables de la mayoría de las verrugas genitales y de la papilomatosis respiratoria recurrente.
- b. Los tipos del VPH 6 y 11 son responsables de la mayoría de casos de neoplasia de piel.
- c. Los tipos del VPH 6 y 11 son responsables de la mayoría de casos de neoplasia cervical.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos problemas está asociado a la infección por VIH?

Seleccione una:

- a. Una menor probabilidad de detectar las infecciones por el VPH.
- b. Una mayor prevalencia del VPH.
- c. Un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de la orofaringe.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Una mujer acude a la consulta. Hace 2 años fue tratada por una lesión de alto grado. Actualmente se le ha hecho una citología con diagnóstico de ASC-US y nos pregunta si se puede vacunar. ¿Sería efectiva la vacuna para esta mujer?

Seleccione una:

- a. No tendría sentido, la vacuna no sería perjudicial pero tampoco le causaría ningún efecto beneficioso ya que la paciente está afectada por una infección por VPH previamente establecida.
- b. Quedaría inmunizada igualmente, la eficacia de la vacuna es independiente de una infección previa.
- c. La vacuna no tiene ningún efecto terapéutico, pero le puede conferir inmunidad para aquellos tipos para los que aún no esté infectada y estén contenidos en la vacuna.

Pregunta 26

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Qué comportamientos aumentan el riesgo de exposición al VPH?

Seleccione una:

- a. Tener nuevas parejas sexuales e iniciación sexual a una edad temprana.
- b. La paridad y el uso a largo plazo de anticonceptivos hormonales.
- c. Todas las anteriores.

Pregunta 27

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones NO es la correcta?

Seleccione una:

- a. Las infecciones por VPH, que persisten durante 2 o más años están altamente vinculadas a las lesiones precancerosas.
- b. La mayoría de las infecciones en las mujeres jóvenes no desaparecen.
- c. El cáncer de cuello uterino es el resultado final de una cadena de eventos que pueden tardar más de 10 años en desarrollarse.

Pregunta 28

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta?

Seleccione una:

- a. Si observa una elevada prevalencia del VPH en los tumores de cabeza y cuello, y es probable que el VPH tenga en este tipo de tumores un rol similar al que tiene en el cáncer de cuello uterino.
- b. La prevalencia del VPH en los tumores de cabeza y cuello no puede interpretarse como un indicador de causalidad a excepción del caso de los tumores de orofaringe.



c. Los tumores de cabeza y cuello no están asociados al VPH.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Muchas mujeres adquieren una infección por VPH, pero la gran mayoría de estas infecciones no progresan a cáncer de cérvix. Así pues, probablemente otros co-factores intervienen en el proceso patológico. ¿Cuáles de estos co-factores han sido establecidos en la carcinogénesis cervical?

Seleccione una:



a. Antecedentes familiares y ser fumadora.



b. Dieta rica en grasas saturadas y el uso de algunos fármacos.



c. Alta paridad, uso a largo plazo de anticonceptivos orales, ser fumadora y co-infección

por otros agentes de transmisión sexual.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Debería hacerse la prueba de detección del VPH a toda mujer que desea vacunarse?

Seleccione una:



a. Sí, porque la vacuna sólo es eficaz en las mujeres que sean negativas para los tipos del VPH incluidos en la vacuna.



b. Sí, ya que si es positiva para la prueba, se le recomendaría no vacunarse.



c. No es necesario realizar la prueba de detección del VPH previa a la vacunación.